

## Addendum NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2

### **Verwijzing naar de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement**

In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 wordt verwezen naar de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Deze laatste is inmiddels op onderdelen gewijzigd en in juli 2006 op de NHG-website gepubliceerd (zie [nhg-artsennet.nl](http://nhg-artsennet.nl) voor versie 1.2). Voortaan is behandeling met een cholesterolsyntheseremmer van mensen met DM2 alleen geïndiceerd als het LDL-cholesterol ten minste 2,5 mmol/l bedraagt.

De volledige tekst met aanbevelingen ten aanzien van het cholesterol luidt: 'Bij patiënten met DM2 en een LDL >2,5 mmol/l (of TC >4,5 mmol/l

als het LDL door een hoog triglyceridengehalte niet te berekenen is) wordt behandeling met een statine geadviseerd. Bij jonge patiënten met een gunstig risicoprofiel en een goede glykemische instelling (HbA1c <7%) kan worden overwogen een hogere behandelgrens te hanteren of de behandeling, in overleg met de patiënt, uit te stellen tot latere leeftijd.

Bij patiënten met DM2 en een LDL <2,5 mmol/l kan een sterk verhoogd risico (bijvoorbeeld slechte metabole controle, nierfunctiestoornis, sterk belaste familieanamnese of clustering van risicofactoren) toch voldoende reden zijn om een statine te overwegen.'