



Diabetes kennis- en  
onderwijsinstituut  
voor de eerste lijn

# Langerhans

## SGLT2-remmer gebruik in de dagelijkse huisartsenpraktijk

### Wat fijn dat u mee doet!

Beste praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige,

Wat fijn dat u mee wilt werken aan dit belangrijke onderzoek naar SGLT2-remmers in de huisartspraktijk. Het invullen gaat het snelst als u uw HIS bij de hand heeft en van te voren even op een rijtje zet wie u een SGLT2-remmer voorschreef de afgelopen tijd\*.

\*waarschijnlijk zijn het er nog niet zoveel en weet u deze patiënten uit uw hoofd. Anders kunt u een lijstje uitdraaien uit uw HIS of bij de apotheek vragen.

Namens Stichting Langerhans,

Drs. Suzanne Bakker, kaderhuisarts diabetes  
Prof. Dr. Henk Bilo, internist n.p.  
Dr. Bertien Hart, kaderhuisarts diabetes  
Dr. Bas Houweling, kaderhuisarts diabetes  
Dr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige

### Achtergrond

Sinds de publicatie van de hernieuwde NHG-standaard worden voor het eerst op grotere schaal SGLT2-remmers voorgeschreven in de huisartspraktijk. Deze SGLT2-remmers verlagen de bloedglucose door het uitplassen van glucose. Daarnaast – en dat is nog veel belangrijker – zorgen deze middelen ook nog eens voor minder complicaties aan hart en nieren bij diabetespatiënten die al schade hebben aan deze organen.

De uitgeplaste glucose is echter ook een uitstekende voedingsbodem voor schimmels. Het is dan ook geen verrassing dat patiënten die deze SGLT2-remmers slikken vaker last hebben van schimmelinfecties aan de geslachtsdelen.

Maar hoe zit dat bij de patiënten in de dagelijkse Nederlandse huisartspraktijk?

Het is belangrijk om te weten omdat deze medicijnen nu vaker worden voorgeschreven om verdere complicaties bij zeerhoogrisico patiënten te voorkomen.

Daarom dit onderzoek!

Stichting Langerhans doet dat onafhankelijk en ongesponsord omdat we het belangrijk vinden voor de eerstelijns diabeteszorg.

Wij analyseren de gegevens en proberen dit te publiceren in het vakblad Huisarts en Wetenschap. We gebruiken de gegevens ook bij een presentatie op de Diabeteswereld Draait Door op 21 juni 2022.

U krijgt een bericht zodra de publicatie er is.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd!

**Let op. Dit is een voorbeeld. Voor de echte vragenlijst online, surf naar [www.enquetesmaken.com/s/langerhans\\_onderzoek1](http://www.enquetesmaken.com/s/langerhans_onderzoek1)**

Hoe vaak is er in jullie praktijk een SGLT2-remmer voorgeschreven aan een patiënt met diabetes NA het uitkomen van de nieuwe NHG-Standaard? \*

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- >10

### Voorschrijven SGLT2-remmer patiënt nummer

**(Let op: deze vragen worden u gesteld per patiënt die een SGLT2-remmer gebruikt)**

Om zoveel mogelijk details te verzamelen vragen we u (en we hopen dat u dit voor ons wilt doen) om per patiënt onderstaande gegevens in te vullen.

Let op, dit gaat alleen over diabetespatiënten die een SGLT2-remmer hebben gekregen vanuit jullie praktijk NA het uitkomen van de NHG-standaard diabetes in november 2021.

**Leeftijd patiënt \***

 jaar

**Geslacht patiënt \***

- Vrouw
- Man

**Diabetesduur**

jaar

**Meest recent HbA1c voor start SGLT2-remmer**

mmol/mol

**BMI**

kg/m<sup>2</sup>

**eGFR**

> 90 ml/min

> 60 ml/min

eGFR in ml/min

**Welke SGLT2-remmer is er voorgeschreven? \***

Canagliflozine (Invokana)

Dapagliflozine (Forxiga)

Empagliflozine (Jardiance)

Ertugliflozine (Steglatro)

**Voor welke indicatie (naast diabetes) is de SGLT2-remmer voorgeschreven (meerder opties mogelijk) \***

Patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten

Patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico (oranje/rood)

Patiënten met hartfalen (HFrEF met linkerventrikel-ejectiefractie < 40%)

Andere reden

**Heeft u patient na start een genitale schimmelinfectie gehad? \***

- ja
- nee

**Zijn er nog andere bijwerkingen opgetreden door SGLT2-remmer? \***

- ja
- nee

**Zo ja, welke bijwerkingen zijn dan opgetreden?**

(meerdere antwoorden mogelijk)

- Urineweginfectie
- Voetulcus
- Amputatie van (deel van de) voet
- Gangreen van Fournier
- eGFR daling > 20%
- Andere bijwerking

**Bijwerkingen genitale schimmelinfecties SGLT2-remmers patient nummer 1**

**Na hoeveel tijd trad de bijwerking genitale schimmelinfectie op? \***

- 1 dag
- 1 week
- 2 weken
- 1 maand
- 2 maanden
- 3 maanden
- > 3 maanden

**Moest de SGLT2-remmer blijvend gestopt worden door deze genitale schimmelinfectie? \***

ja

nee

**Heeft deze patient 12 maanden voor het gebruik van de SGLT2-remmer een genitale schimmelinfectie gehad? \***

ja

nee

U bent nu klaar met de enquête. Dank u wel voor uw deelname.

Wij vanuit Stichting Langerhans gaan de gegevens analyseren en zullen dit proberen te publiceren in het vakblad Huisarts en Wetenschap. We zullen de gegevens ook gebruiken bij een presentatie op de Diabeteswereld Draait Door op 21 juni 2022. We zullen u ook een berichtje sturen zodra de gegevens gepubliceerd zijn.

U kunt het venster nu sluiten.

